

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO : 26.05.2016 / 10653

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Turuncgiller*	Pas böcüsü (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	20 ml/100 l su yumurta, nimf, ergin	14 gün
	Kırmızı örümcek (<i>Panonychus citri</i>)	20 ml/100 l su yumurta, nimf, ergin	
Elma	Avrupa kırmızı örümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	30 ml/100 l su yumurta, nimf, ergin	14 gün
	Akdiken akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)	25 ml/100 l su yumurta, nimf, ergin	
Kiraz	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su nimf, ergin	14 gün
Vişne	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su nimf, ergin	14 gün
Bağ**	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su nimf, ergin	14 gün
Şeftali	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su nimf, ergin	14 gün
Nektarin	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su nimf, ergin	14 gün

*Turuncgillerde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden BKÜ ve su karışımı depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmaktadır.

Kalibrasyon:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinasının Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Turuncgil- Turuncgil kırmızıörümceği: On yaprakta yapılacak sayımlarda 9 ve üzeri canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulamalar çiçeklenmeden önce yapılmalı bu dönem geçirilmi ise meyve bağladıktan bir hafta sonra yapılmalıdır.

Turuncgil- Pas böcüsü: Mayıs ayı başından itibaren 7-8 günde bir bahçenin değişik yerlerinden el lupu ile 100 meyvede yapılan sayımlarda, bir görüş alanında (1-2 cm²) 1-2 adet Pas böcüsü görüldüğünde ilaçlı mücadeleye başlanır.

Elma - Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Kiraz ve Vişne- İki noktalı kırmızıörümcek: Uygulamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.

Bağ- İki noktalı kırmızıörümcek: Yaprak başına 5-8 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftali ve nektarin- Kırmızıörümcek: Yapılan sayımlarda, yaprak başına ortalama 3-5 adet üzerinde kırmızıörümcek bulunması durumunda uygulama yapılabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ARGEDOR 240 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir Akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ARGEDOR 240 SC'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 23 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünlerinin formülasyonu ve özellikle solvent miktarı karışımı etkiler. Bu nedenle karışım yapılacaksa uygulama öncesi bir karışım testi yapılmalıdır.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.

ARGEDOR SC 240

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	23	AKARİSİT (KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)
-------	----	-------------------------------------

240 g/L Spirodiclofen

- Önce etiketi okuyunuz
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü uygulandıktan 4 saat süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan bitki koruma ürününün boş ambalajının dörttebirine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Solunması halinde: Solunması halinde temiz havaya çıkartılır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Ciltle teması halinde: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Gözle teması halinde: Gözler derhal bol suyla yıkanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Yutulması haline: Hasta kusturulmamalıdır. Ağız iyice su ile çalkalanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Zehirlenme belirtisi görülürse semptomatik tedavi uygulanmalıdır, bilinen bir antidotu yoktur.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

12 Haziran 2026
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARŞILAMA BİREYİ

30

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Baire Başkanı

NET MİKTARI :
AZAMI PER.SAT.FİYATI :
İÇİNDEKİLER:
1) Spirodiclofen 2) Etoxylated tristyrylphel phosphate
3) Ethylen glycol
Zararlılık işaretleri:



Uyarı Kelimesi: Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

—Balıklara zehirlidir. Yeraltı veya yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

—Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

—Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

—Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

—Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma bitki koruma ürününün önerildiği şekilde, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün hatalı depolanmasından, hatalı doz ve zamanda kullanımından doğabilecek zararlarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16 1.ç kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royaltarim.com

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No:16 1.ç Kapı No :106 Seyhan / Adana
Ticaret Sicil No : 63174 Tel: 0322 502 76 51
Zilyapaşa V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Baire Başkanı