

İMAL TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ :  
ŞARJ NO :  
RUHSAT TARİH VE NO :10.02.2015/10093

## KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
ŞEKER PANCARI	Yaprak leke hastalığı ( <i>Cercospora beticola</i> )	50 ml/da	28 gün
BUĞDAY	Tahıl Küllemesi ( <i>Erysiphe graminis</i> )	60 ml/da	35 gün
	Sarı Pas ( <i>Puccinia striiformis</i> )		
	Septorya Yaprak Lekesi ( <i>Septoria tritici</i> )		

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karşıtırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karşıtırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

## KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

## UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karşıtırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Buğday sarı pas, Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

## Buğdayda tahıl küllemesi

İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

## DECARS ULTRA SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	B1:1	G1:3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
310 g/l Thiophanete Methyl + 187 g/l Epoxiconazole			

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama makinesinin deposuna boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

## ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi ciltte ve gözde tahriş.

## İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Vücuda bulaşmışsa bulaşık elbiseler derhal çıkarılmalı, temas eden vücut kısımları bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Göz ile temasında en az 15 dakika temiz su ile göz kapağı açılarak yıkanmalıdır. İlaç yutulmuşsa ağız bol miktarda su ile yıkanmalı ve bol miktarda su içirilmelidir. Zehirlenme durumunda doktor çağırılmalı ve ilaç ambalajı ve etiketi gösterilmelidir.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

*N. Arıcan*  
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı

NET MİKTARI :  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI :  
İÇİNDEKİLER:

- 1) Epoxiconazole 2)Thiophanete Methyl
  - 3)Etoxylyated trystrylphenol 4)Na DBS
- ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT  
ZARARLILIK İFADELERİ:

- H302Yutulması halinde zararlıdır.  
H317Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
H319Ciddi göz tahrişine yol açar.  
H332 Solunması halinde zararlıdır.  
H341 Genetik hasara yol açma şüphesi var.  
H351Kansere yol açma şüphesi var.  
H361fd Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.  
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- ÖNLEM İFADELERİ:
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
P201Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.  
P273Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P363Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.  
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P501İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatına uyun

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT  
İHRACAT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.  
Çınarlı Mah. 61027 SK. No:106 Seyhan / Adana  
B Blok No:16 İ. Karatoprak. No:106 Seyhan / Adana  
Ticaret Sicil No: 63774 Tel: 0322 502 76 51  
Ziyapaşa V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

*Abuzer Remzi DEMİREL*

08 Ocak 2024  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

**Buğdayda septorya yapraklekesi**

Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam ilaçlaması uygulanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağın tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde tarla bulaşksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalarda devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

**Şekerpancarı yaprak leke hastalığı:**

Hastalıkla kimyasal mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. İlaçlamalara hastalık için uygun hava şartları oluştuğunda ve tarlada yapraklar üzerinde ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır. Hastalığın seyrine göre kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.

**DİRENÇ YÖNETİMİ:**

**DECARS ULTRA SC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup **B1:1/G1:3** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **DECARS ULTRA SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup **B1:1/G1:3** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

**DECARS ULTRA SC**

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	B1:1	G1:3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
310 g/l Thiophanete Methyl + 187 g/l Epoxiconazole			

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- **KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ İYİCE ÇALKALAYINIZ.**
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürünü kendi ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka bir amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan bitki koruma ürünü kutularına gıda ve içecek koymayınız.

**DEPOLAMA DURUMU:**


Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile üreticiler bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üreticiler bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde doğacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

**ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**  
 Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş  
 Merkezi B-Blok No:16 İç kapı No:106 Seyhan/ADANA  
 Tel: 0 (322) 502 76 51 [info@royalfen.com](mailto:info@royalfen.com)  
 Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi  
 Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE  
 Tel: 0 (388) 503 08 80 [info@royalfen.com](mailto:info@royalfen.com)



08 Ocak 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
 KABUL EDİLMİŞTİR.

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT  
 İHRACAT VE TİC.LTD.ŞTİ.  
 Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.  
 B Blok No:16 İç Kapı No:106 Seyhan / Adana  
 Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51  
 Ziyapaşa V.D. 735 671 2000 [info@royalfen.com](mailto:info@royalfen.com)

Abuze Renzi DEMİREL