

İmal Tarihi :  
 Son Kullanma Tarihi :  
 Şarj No :  
 Ruhsat Tarih ve No : 31.01.2018 /11043

**ÖZELLİKLERİ:**

Bitki koruma ürünü sistemik etkilidir. Uygulamadan kısa süre sonra bitki bünyesine geçer ve etkisini 14 ila 21 gün arasında korur.

**KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Kullanma dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk	Tütün beyazsineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	40 g / da (Larva - ergin)	-
	Pamuk yaprakbiti ( <i>Aphis gossypii</i> )	10 g / da (Nimf - Ergin)	-
	Yaprakpireleri ( <i>Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens</i> )	10 g / da (Nimf - Ergin)	-
Patates	Patates böceği ( <i>Leptionotarsa decemlineata</i> )	6 g / da (Larva - Ergin)	7gün
Domates (Tarla)	Tütün beyazsineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	30 g / da (Larva - Ergin)	3 gün
Domates (Sera)	Tütün beyazsineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	30 g / 100 L su (Larva - Ergin)	3 gün
Antep fıstığı	Antepfıstığı psillidi ( <i>Agonoscena pistaciae</i> )	20 g / 100 L su (Nimf - Ergin)	7 gün
Elma	Elma yeşil yaprakbiti ( <i>Aphis pomi</i> )	20 g / 100 L su (Ergin - Nimf)	14 gün
Karpuz	Şeftali yaprakbiti ( <i>Myzus persicae</i> )	25 g / da (Ergin - Nimf)	7 gün
Biber (Sera)	Şeftali yaprakbiti ( <i>Myzus persicae</i> )	25 g / 100 L su (Ergin - Nimf)	3 gün
	Tütün beyazsineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	30 g / 100 L su (Larva - Ergin)	-
Koruyucu Hıyar (sera)	Sera beyazsineği ( <i>Trialeurodes vaporarum</i> )	30 g / 100 L su (Larva - Ergin)	-
	Tütün beyazsineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	30 g / 100 L su (Larva - Ergin)	3 gün
Pathcan (Sera)	Tütün beyazsineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	30 g / 100 L su (Larva - Ergin)	1 gün

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

# FORCOP 20 SP

Suda Çözünen Toz (SP)

GRUBU 4A İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)

%20 Acetamiprid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN KONULAR DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Hareketlerde uyuşukluk, adale kasılmaları, denge bozukluğu, solunum zorluğu, gözyaşı ve sümük artışı.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ:**

**Solunması halinde:** Acilen temiz havaya çıkarınız. Soluk alış verişini yoksun teneffüs uygulayınız. Soluk alış verişinde zorlanıyorsa oksijen veriniz. Doktor çağırınız.

**Göze teması halinde:** Deriyi sabun ve bol su ile yıkayınız.

**Göze teması halinde:** Hemen en az 5 dakika süre ile bol su (ılık) ile yıkanmalıdır. Kaşınma meydana gelirse tıbbi destek alınız.

**Yutulması halinde:** Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Ağız suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.

**ANTİDOTU VE TEDAVİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı :  
 Perakende Satış fiyatı:  
 İÇİNDEKİLER: 1) Acetamiprid  
 ZARARLILIK İŞARETLERİ:

**UYARI KELİMESİ: DİKKAT****ZARARLILIK İFADELERİ:**

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H412 Sıcak ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

**GÜVENLİK İBARELERİ:**

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya hekimi arayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Arılara ve Balıklara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. Sulara buluşturmayınız.
- Tavsiye edilen bitkilerde tavsiye edilen dozlarda ve şekilde kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde saklayınız.

**DEPOLAMA DURUMU:**


Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT  
 İHRACAT VE TİC.LTD.ŞTİ.

Çınarlı Mah. 67027. Sok. Nuri Çoşun İş. Merk.  
 B Blok No:16 Kat: 3. Kat Seyhan / Adana  
 Ticaret Sicil No: 230744 Tel: 0322 502 76 51  
 Ziyapaşa V.D. 035 071 2000 info@royalfen.com



08-01-2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
 KABUL EDİLMİŞTİR.

Abuter Remzi DEMİRCİ



**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ**

**Pamukta tütün beyazsineğine karşı** beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğu mücadele başlanmalıdır.

**Pamukta pamuk yaprakbitine karşı** tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Tarla döneminde 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında bitki koruma ürünü mücadele önerilir.

**Pamukta pamuk yaprakpirelerine karşı** Tarla kontrollerinde, yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpıresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

**Patateste patates böceğine karşı** Örnekleme için tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek zararlıların yumurta, larva ve ergini ararız. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaktır, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden uygulama gerekmez.

**Domates (sera), Biber (sera), Hıyar, kornişon, Patlıcan (sera)** beyazsineğe karşı beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

**Elmada elma yeşil yaprakbitine karşı** Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15'inde bulaşıklık olursa uygulama yapılmalıdır.

**Şeftali yaprakbitine karşı** tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek kimyasal mücadeleye karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

**Antepfıstığı psillidine karşı** haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumaajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Aynı yetiştirme periyodunda 2 den fazla uygulama yapılmamalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ**

**FORCOP 20 SP** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **FORCOP 20 SP**'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:**

Alkali özellikteki bitki koruma ürünleriyle kullanılmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

**FORCOP 20 SP**

Suda Çözünen Toz (SP)

GRUBU	4A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

%20 Acetamiprid

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**  
ROYAL- FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.ve  
TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş  
Merkezi B-Blok No:16 İç kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 [info@royalfen.com](mailto:info@royalfen.com)

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize  
Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 [info@royalfen.com](mailto:info@royalfen.com)

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT  
İHRACAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  
Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.  
B Blok No:16 İç Kapı No:106 Seyhan / Adana  
Ticaret Sicil No: 29174 Tel: 0322 502 76 51  
Ziyapaşa V.D. 065 071 2000 [info@royalfen.com](mailto:info@royalfen.com)

Abuzer Remezi DEMİREL

08 -01- 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

