

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarih ve No.su: 19.03.2024 / 13075

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Patlıcangiller külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	125 ml / 100 L su	3 gün
Biber (Sera)	Patlıcangiller külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	125 ml / 100 L su	3 gün
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	100 ml / 100 L su	3 gün
Buğday	Buğdayda septorya yaprak lekesi ( <i>Septoria tritici</i> )	75 ml / da	56 gün
	Tahıl küllemesi ( <i>Erysiphe graminis</i> )		
	Sarı pas ( <i>Puccinia striiformis</i> )		

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.


**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Patlıcangiller külleme [Domates (Sera)], [Biber (Sera) Külleme]:**

Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda 10 gün ara ile ilaçlamalara devam edilir.

**Kabakgillerde Külleme [Hıyar (Sera) Külleme]:** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C nin üstünde ve orantılı nemde % 50' nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir. Bir serada azami 3 uygulama yapılmalıdır.

19 Mart 2024  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.

# ROYTAZONE 320 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	G1:3	C3:11	FUNGİSİT(Mantar İlacı)
------	------	-------	------------------------

200 g/ITebuconazole+120g/l Azoxystrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü boş ambalajlarının içine dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama makinesinin deposuna boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Nefes almada ve hareket etmede güçlük, kramplar, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısıyla birlikte ishal görülebilir.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ:**

**Yutulursa:** Yutulmuşsa, hemen tıbbi yardım isteyiniz ve ürünün etiket ve ambalajını gösteriniz. Hastayı kusturmayınız.

**Gözlere teması:** Hemen bol su ile azami 15 dakika göz kapağı dahil gözleri iyice çalkalayınız. Kontak lens kullanılıyor ise, çıkarınız. Hemen tıbbi yardım isteyiniz.

**Cilde teması:** İlaçla bulaşık giysileri hemen çıkarınız. Bulaşan yerleri hemen bol su ile yıkayarak temizleyiniz. Cilt tahrişi kalıcı ise, doktora müracaat edin.

**Solumun yoluyla:** Temiz havaya çıkın. Solumun düzensiz yahu durmuş ise, suni teneffüs uygulayın. Hastayı sıcak tutarak, istirahat ettirin. Doktor çağırın veya hemen Zehir Danışma Merkezini arayın.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ TEL(UZEM): 114**

Net Miktarı :  
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV' li) :  
İÇİNDEKİLER:  
Azoxystrobin, Tebuconazole  
ZARARLILIK İŞARETLERİ

Ek-1



**UYARI KELİMESİ: TEHLİKE**

**ZARARLILIK İFADELERİ:**

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H331 Solunması halinde toksiktir.

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ:**

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P311 ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf ediniz.

EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

-Bitki koruma ürünü kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

-Havuzları, nehirleri ve su yollarını Bitki koruma ürünü ve boş ambalajla kirlitemeyiniz.

-Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, üreticiler bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üreticiler bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT  
İHRACAT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.  
Çınarlı Mah.61022710000 Kar Nuri Çomu İş. Mark.  
B Blok No:16 Kat:100 Seyhan / Adana  
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51  
Ziyapaşa V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

Abuzer Renzi DEMİREL



**Buğdayda tahıl küllemesi**

İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

**Buğday sarı pas**, Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Hasada bir aya kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır.

**Buğdayda septorya yapraklekesi**

İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağın tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde tarla bulaşksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalarda devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ**

**ROYTAZONE 320 SC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 ve C3:11 olarak sınıflandırılmış bir Fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ROYTAZONE 320 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 ve C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılacak ise, karışım yapmadan önce ön karışım ve fitotoksite testi yapılması önerilir.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.

# ROYTAZONE 320 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	G1:3	C3:11	FUNGİSİT(Mantar İlacı)
------	------	-------	------------------------

200 g/ITebuconazole+120g/l Azoxystrobin

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

**ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**  
 Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş  
 Merkezi B-Blok No:16 İç kapı No:106 Seyhan/ADANA  
 Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com  
 Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi  
 Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE  
 Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com

**ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT  
 İHRACAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**  
 Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.  
 B Blok No:16 İç Kapı No:106 Seyhan / Adana  
 Ticaret Sicil No: 63774 Tel: 0322 502 76 51  
 Ziyapaşa V.D. No:671 2000 info@royalfen.com

Abuzer Remzi DEMİREL

19 Mart 2024  
 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
 GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
 KABUL EDİLMİŞTİR.

