

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarı No :
Ruhsat Tarih ve No :

KULLANILACĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Kullanma dozu ve dönem	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
	Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)	22 g / 100 L su (Ergin - Nimm)	3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çabır durumundayken karşım depoya ilave edilir. Karşıtırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karşıtırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karşımı ayrı gün içinde kullanılır.

KALIBRASİYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirtili alana verilecek karşım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karşırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Biber (Sera), Şeftali yaprakbiti' ne karşı ilaçlama zamanını saptama amacı ile biber diktili alana köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüf olarak birer yaprak koparılır. Biber bitkilerinde 20-40 adet yaprakla lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleyle başlamak gerekir. Bununla birlikte paraziit ve predatorler gözlenerek, ilaçlamalara karar vermeden önce faydalarının etkinliği dikkate alınmalıdır. Yaprakbiti popülasyonu hava şartları ile çok ilgilidir. Kuraklık ve sıcaklık artığında popülasyon aniden düşer. Bu husus ilaçlamalarda dikkate alınmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

TEPPLAN WG adı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 29-4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **TEPPLAN WG'** nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulamaya sayısını aşmayınız. Uygulamamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 29,4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞIBİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karşım yapmadan önce ön karşım testi yapılması tavsiye edilir.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

10 Ağustos 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

Sekcan TÜRKÖZ
Teknik Müdür

royalfen
KİMYA TARIM LTD. ŞTİ.
Royal-Fen Kimya Tarım İht. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
TEPPLAN WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU 29-4A İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)

%20 Flonicamid + %15 Acetamiprid

- Önce etkeği okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıdalarından ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN KONULAR DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülür.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Solumması halinde: Hastayı sakin tutun, temiz havaya çıkarın. Gerektirse nefes almasına yardımcı olun. Bir doktora danışın.

Çiğne teması halinde: Etkilenen bölgeleri sabun ve suyla iyice yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Tahriş geçirse, tıbbi yardım alın.

Gözle teması halinde: Gözü açık tutarak hemen 15-20 dakika süre ile bol su ile yıkayın. Kontak lensleri çıkarın. Kapsıntı meydana gelirse tıbbi destek alın.

Yutulması halinde: Bilinçsiz bir kişiye asla ağzdan herhangi bir şey vermayınız. Ağzı suyla çalkalayınız. Kusmaya neden olmayın. Derhal tıbbi müdahale gerektirir.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanın.

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ: UZEM (ULUSAL ZEHİR MERKEZİ) 114

Net Miktarı :
Perakende Satış Fiyatı :
İÇİNDEKİLER: 1) Acetamiprid 2) Flonicamid 3)
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT
ZARARLILIK İFADELERİ :

- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- H412 Sıcıl ortama uzun süre kalıcı, zararlı etki.
- ÖNLEM İFADELERİ:
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız
- P264 Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.
- P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz ve sigarada içmeyin.
- P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.
- P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya hekimni arayın.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
- P501 İçerdiği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatına uyun.
- KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**
- Arılara ve Balıklara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. Sulara bulaştırmayınız.
- Tavsiye edilen bitkilerde tavsiye edilen dozlarda ve şekilde kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Orjinal ambalajında serin ve kuru yerlerde saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orjinal ambalajlarında satılmak kaydı ile üreticiler bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üreticiler bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde yaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA:

HANGZHOU TOPAGRO BIOSCIENCE CO., LTD.
Room 1606, Unit 3, Building 3, Wanda Commercial Center, No. 666, Hangxing Road, Gongshu District, Hangzhou, Çin.

ÜRETİM TESİSİ:

SHAANXI HENGTIAN BIOLOGICAL AGRICULTURE CO., LTD.
Dali Core Zone, Weinan National Agricultural Science And Technology Park Çin

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İHT. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Çınarı Mah. 61027 Sk. Sınar Nuri Çorum İş Merk. B blok No:16 İç Kapı No:106 SEYHAN/ADANA/TÜRKİYE
Tel: 0 (322) 502 76 51