

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO'SU : 03.11.2022/12549
KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
*Pamuk	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	150 ml /da larva ve yumurta	7 gün
Elma	Elma içkürdü (<i>Cydia pomonella</i>)	20 ml/100 l su Larva	3 gün
**Bağ	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	20 ml/100 l su Larva	7 gün
	Bağ maymuncukları (<i>Otiarhynchus spp.</i>)	25 ml/100 l su Larva	
Mısır	Bozkurt (<i>Agrotis spp.</i>)	50 ml/da Larva	14 gün
	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia spp.</i>)	30 ml/da Larva	
	Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	30 ml/da Larva	
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	40 ml/da Larva ve Ergin	3 gün
	Bozkurt (<i>Agrotis spp.</i>)	40 ml/100 l su	
ŞEKERPANCARI	Pancar piresi (<i>Chaetocnema spp.</i>)	25 ml/da (Ergin)	3 gün
Domates	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	50 ml/da (Larva)	3 gün
Fındık	Fındık kurdu (<i>Curculio nucum</i>)	50 ml/da Ergin	7 gün
Lahana	Lahana yaprakgüvesi (<i>Plutella xylostella</i> = <i>Plutella maculipennis</i>)	25 ml/da (Larva)	2 gün
Hububat	Kimil (<i>Aelia rostrata</i>)	45 ml/da Kışlamış ergin 2. ve 5. Dönem nimf ve yeni nesil ergin. 1-3 dönem nimf 50 ml/da Larva dönemi yeşil aksam uygulaması	14 gün
	Ekin Kambur Böceği (<i>Zabrus spp.</i>)	20 ml/da Sath uygulaması	
Zeytin	Zeytin güvesi (<i>Prays oleae</i>)	15 ml /100 lt. su larva	3 gün
	Zeytin sineği (<i>Bactrocera oleae</i>)	30 ml/100 l su çiçek nesli	
	Zeytin karaşnili (<i>Salsetia oleae</i>)	30 ml/100 l su (larva)	
	Zeytin pamuklu biti (<i>Euphyllura olivina</i>)	30 ml/100 l su	

* Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününün aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

royalfen
KİMYA TARIM LTD. ŞTİ.
Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

TAİDO CS

Kapsül Süspansiyon (CS)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT
------	----	------------

50 g/l Lambda-cyhalothrin

-Önce etiketi okuyunuz.
-Evde kullanmayınız.
-Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
-Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
-Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
-İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

-Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama makinesinin deposuna boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtiler; başlangıçta mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir. İlaç ile temas, deri ve göz tahrişine sebep olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Göze teması halinde: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayınız. Varsa kontakt lensleri çıkartınız. Derhal tıbbi yardım alın.

Ciltle teması halinde: Derhal sabun ve su ile yıkayınız. Doktora başvurun.

Soluması halinde: Kişiyi temiz havaya çıkartınız. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayınız. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutunuz. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşınız.

Yutulması halinde: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Hastayı kusmaya zorlamayınız.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme anında zehir danışma merkezine başvurunuz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI :
İÇİNDEKİLER: Lambda-cyhalothrin

ZARARLILIK İŞARETLERİ



Uyarı Kelimesi: Tehlikeli

ZARARLILIK İFADELERİ:

H301 Yutulması halinde toksiktir.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H330 Soluması halinde öldürücüdür.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
P260Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayınız.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P301+310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya hekimi arayınız.
P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
P280 Korumaya eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Havuzları, nehirleri ve su yollarını bitki koruma ürünleri ve boş ambalajla kirlenmeyiniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile üreticiler ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üreticiler, ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde doğacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Fatihhan Kürşad TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

**ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**
Eski Mah. 31027 Sk. Sunar Murt Çorlu İş Merk.
3 Blok No:18 İç Kapı No: 1/6 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Ziyapasa V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta yeşil kurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Elma içkurduna karşı: Elma içkurduna yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdunu mücadelesinde hedef, her dölde ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Bağ salıkım güvesine karşı salıkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşır, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıklar üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-derece ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

Mısır koçan kurdü ve Mısır kurduna karşı: İlk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile iki uygulama daha yapılır.

Patates böceğine karşı: Günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C' ya ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek ocaklarda zararlıların yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci dölde karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci dölde karşı uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden uygulama gerekmez. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40'a kadar çıkmaktadır.

Buğday: Ekin kamburböceğine karşı: Yüzeysel ilaçlama yapılır.

Domateste yeşil kurta karşı: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuşsa derhal mücadeleye geçilir.

Lahana yaprak güvesine karşı: Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir.

Zeytin güvesine karşı: Zararlıların çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10'dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10'unda canlı "yumurta+larva" olduğunda ilaçlama yapılır.

Zeytin karakoşniline karşı: Uygulama zamanı, aktif larva çıkışına göre saptanır. Yapılan kontrollerde 80-100 cm'lik sürgünde ortalama 4-6 adet ergin dişi koşnile ulaştığında mayıs ayının sonlarından itibaren ve %50'nin açıldığı devrede birinci uygulama, %90'ın açıldığı devrede ise 2. uygulama yapılmalıdır. Ancak zararlıların %50-90 açılımının olduğu dönemde, bahçede diğer zararlılara (Zeytin kabuklubiti vs.) karşı yapılan uygulamalar bu zararlıyı baskı altına aldığından, bir uygulama yeterlidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TAİDO CS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **TAİDO CS'** nin aynı sezonun içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A haric) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.

TAİDO CS

Kapsül Süspansiyon (CS)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT
------	----	------------

50 g/l Lambda-cyhalothrin

RUHSAT SAHİBİ FIRMA

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.ve TİC.LTD. ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16

İç kapı No:106 Seyhan/ADANA Tel: 0 (322) 502 76 51

info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol

Caddesi No:3 Bor/NİĞDE Tel: 0 (388) 503 08 80

info@royaltarim.com

İHRACATÇI FIRMA

Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.

Room 10-6, Shidai Square, No.8, Lengjing Street, Ningbo 315010, Zhejiang,

P.R. China

İMALATÇI FIRMA (FABRİKA)

Shandong Zhongyuan Chemical CO. LTD.

Adres: No 27 Kalyuan sokak, Economic Development Bölgesi, Shanghe

Mahallesi, Jinan Şehri, Shandong İlçesi, Çin

Fatihhan Kırşad TURGUT

Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.

Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.

B-Blok No:16 İç Kapı No: 106 Seyhan/ADANA

Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51

Ziyapasa V.D. 738 071 2000 info@royalfen.com



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

04 10 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.