

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO :26.05.2016/10653

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Turunçgiller*	Pas böcüsü (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	20 ml/100 L su (yumurta, nimf, ergin)	14 gün
	Kırmızı örümcek (<i>Panonychus citri</i>)	20 ml/100 L su (yumurta, nimf, ergin)	
Elma	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	30 ml/100 L su (yumurta, nimf, ergin)	14 gün
	Akdiken akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)	25 ml/100 L su (yumurta, nimf, ergin)	
Kiraz	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 L su (nimf, ergin)	14 gün
Bağ**	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 L su (nimf, ergin)	14 gün
Şeftali	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 L su (nimf, ergin)	14 gün

*Turunçgillerde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken BKÜ ve su karışımı depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

Kalibrasyon:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaçlama Makinasının Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ARGEDOR SC 240

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	23	AKARİSİT (KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)
-------	----	----------------------------------

240 gram/litre Spirodiclofen

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

-EVDE KULLANMAYINIZ

-ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 4 SAAT İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

-İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA MAKİNASININ DEPOSUNA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

İnsanlarda belirgin bir zehirlenme belirtisi saptanmamıştır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

NET MİKTARI :

Azami Per. Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

1)Spirodiclofen 2)Etoxylated tristryllphel phosphate

3)Ethylen glycol

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Korumaya eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

–Balıklara zehirlidir. Yeraltı veya yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

–Arlara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

–Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

–Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

–Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin-kuru) şartlarda orijinal ambalajında depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma bitki koruma ürününün önerildiği şekilde, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün hatalı depolanmasından, hatalı doz ve zamanda kullanımından doğabilecek zararlarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma - Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Kiraz- İki noktalı kırmızıörümcek: Uygulamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.

Bağ- İki noktalı kırmızıörümcek: yaprak başına 5-8 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftali- Kırmızıörümcek: Yapılan sayımlarda, yaprak başına ortalama 3-5 adet üzerinde kırmızıörümcek bulunması durumunda uygulama yapılabilir.

Turunçgil- Kırmızıörümcek: On yaprakta 4-9 canlı bireyin üstünyse akarisitlerle mücadeleye geçilir.

Turunçgil- Pasböcüsü: Mayıs ayı başından itibaren, 100 meyvede yapılan bir görüş alanında (1 cm²) 1-2adet pasböcüsü görüldüğünde ilaçlı mücadeleye başlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ARGEDOR 240 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir Akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ARGEDOR 240 SC'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 23 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünlerinin formülasyonu ve özellikle solvent miktarı karışımı etkiler. Bu nedenle karışım yapılacaksa uygulama öncesi bir karışım testi yapılmalıdır

Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ARGEDOR SC 240

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	23	AKARİSİT (KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)
-------	----	----------------------------------

240 gram/litre Spirodiclofen

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması halinde: Solunması halinde temiz hava çıkartılır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Ciltle teması halinde: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Gözle teması halinde: Gözler derhal bol suyla yıkanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Yutulması haline: Hasta kusturulmamalıdır. Ağız iyice su ile çalkalanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER: Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir.

İMALATÇI FİRMA:

AGROBEST GRUP Tarım İlaçları Toh.İml.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş.
Atatürk Mah.Kazım Karabekir Cad.No:61 Ulucak Mevkii Kemalpaşa-İZMİR
Tel: 0 (232) 877 17 70 Fax:0 (232) 877 17 71
agrobestgrup@agrobestgrup.com



RUHSAT SAHİBİ FİRMA: ROYAL-FEN KİMYA Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

Sinanpaşa Mah.Kozan Cad.Yüreğir Otagar İçi No:226 Yüreğir-ADANA

Tel: 0 (322) 321 11 01 Fax:0 (322) 321 11 02

info@royaltarim.com