

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre |
|----------------|---|----------------------------|--|
| Şeftali | Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) | 50 ml/100 l su (larva) | 14 gün |
| Patlıcan | Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>) | 50 ml/da (larva) | 3 gün |
| Biber (Sera) | Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>) | 50 ml/100 l su (larva) | 3 gün |
| Pamuk | Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>) | 50 ml/da (larva) | 28 gün |
| Domates (Sera) | Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>) | 50 ml/100 l su (larva) | 1 gün |
| Zeytin | Zeytin karakoşnili (<i>Saissetia oleae</i>) | 50 ml/100 l su (larva) | 14 gün |
| | Zeytin kabuklubiti (<i>Parlatoria oleae</i>) | | |

ÖZELLİKLERİ: Böcek regülatörü etkisini 20-30 gün korur. Larvalar ve nimflerin gelişimi engellenir ve dönem değiştirme sırasında ölürlür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırmaya devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulama birinci ve ikinci döllere karşı yapılır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Domates, biber ve patlıcanda tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklarından olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

TAWATTIR 10 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup 7C İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)

100 g/l Pyriproxyfen

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- **KULLANILAN ÜRÜNÜNÜN BOŞ AMBALAJININ DÖRTTEBİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Yutulduğunda: Yutulması halinde kusturmaya çalışmayın. Hastanın ağzını su ile çalkalamasını sağlayın. Doktora başvurunuz.

Deri teması: Kirlenmiş giysileri çıkarın ve sabun ve su ile iyice yıkayın. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.

Göz teması: Göze temas ettiği takdirde, en az 15 dakika gözleri açık tutarak su ile yıkayın, tıbbi yardım isteyin.

Soluma: Hastayı, temiz havaya çıkartın. Herhangi bir belirti veya belirtiler oluşursa veya devam ederse, tıbbi yardım alınız. Kuşku duyulan tüm durumlarda tıbbi yardım sağlayın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI :
İÇİNDEKİLER:

1) Pyriproxyfen 2) Nonylphenoxy polyethyleneoxide 3) Ksilen ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H312Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H319 Göz tahrişine yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P391 Döküntüleri toplayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.

EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

• Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

• Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

• Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.

• Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde doğacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

TAWATTIR 10 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

| | | |
|------|----|---------------------------|
| Grup | 7C | İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) |
|------|----|---------------------------|

100 g/l Pyriproxyfen

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğu mücadele başlanmalıdır.

Zeytin karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Yapılan kontrollerde 80-100 cm' lik sürgünde ortalama 4-6 adet ergin dişi koşnile ulaştığında mayıs ayının sonlarından itibaren ve %50' nin açıldığı devrede birinci uygulama; % 90' ının açıldığı devrede ise 2. uygulama yapılmalıdır. Ancak zararlının %50-90 açılımının olduğu dönemde, bahçede diğer zararlılara (Zeytin kabuklubiti vs.) karşı yapılan uygulamalar bu zararlıyı baskı altına aldığından, bir uygulama yeterlidir.

Zeytin kabuklubitine karşı: Zararlının 1.dölüne karşı çok yüksek popülasyonlar dışında uygulamalar yapılmamalıdır. Zararlının ikinci dölünde ise, bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme oranı göz önüne alınmalıdır. Uygulama, yumurtaların %50' sinin açıldığı ve birinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu zaman yaprak ve meyvelerin tamamının ıslanabileceği şekilde yapılır. Bir uygulama yeterlidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

TAWATTIR 10 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 7C olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TAWATTIR 10 EC'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 7C harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ROYAL-FEN KİMYA

Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Sinanpaşa Mah.Kozan Cad.Yüreğir Otogar İçi
No:226 Yüreğir-ADANA

Tel: 0 (322) 321 11 01 Fax:0 (322) 321 11 02 info@royaltarim.com

ÜRETİCİ FİRMA :

GÜNER TAR. MÜH. GIDA HAYV. ve İNŞ.TAAH.TUR. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Bor Karma Org. San. Böl. 2 Nolu yol 14. Cadde No: 1 Bor/NİĞDE

Tlf: 0 388 315 00 82 - 0 388 315 00 83