

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO : 26.12.2024 / 13374

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Armut	Armut karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	25 g /100 l su	14 gün
Buğday	Buğdayda septorya yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	75 g / da	35 gün
	Sarı pas (<i>Puccinia striiformis</i>)		
Domates	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	50 g /100 l su	7 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	25 g /100 l su	14 gün
	Elma küllemesi (<i>Podosphaera leucotricha</i>)		
Kayısı	Çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)	60 g /100 l su	14 gün
Nar	Phytophthora Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (<i>Phytophthora spp</i>)	60 g /100 l su	14 gün
Yerfıstığı	Yerfıstığında serkospora yaprak lekesi (<i>Cercospora arachidis</i> = <i>Cercospora personata</i>)	50 g /da	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışimli su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

royalfen
KİMYA TARIM LTD. ŞTİ.
Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYCUR 25 WP

Islanabilir Toz (WP)

GRUP	G1:3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	------	-------------------------

%25 Tebuconazole

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 - **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine %'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, göz kararması, ateşe neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme halinde DOKTOR çağırınız. İlacın etiketi ve ambalajını beraberinizde bulundurunuz.

Solunması Halinde; Hastayı açık havaya çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurun.

Deri ile Teması Halinde; Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

NET MİKTARI :
AZAMI PER.SAT.FİYATI:

İÇİNDEKİLER:

1. Tebuconazole

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H314:** Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- H315:** Cilt tahrişine yol açar.
- H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H361:** Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- H411:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

- P202:** Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
- P273:** Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- P280:** Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanınız.
- P301+P312:** YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNE veya doktoru/hekimi arayınız.
- P501:** İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

Fatihhan Kürşad TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
M. Mah. 67027 Sok. Sunar Nuri Çomcu İş Merk.
B Blok No:16 İç Kapı No: 108 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Ziyapaşa V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

26 Aralık 2024
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Armut karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır.)

2.uygulama: Beyaz rozet döneminde.

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılır.

Buğday sarı pas: Sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklarındaki belirtileri her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 oranlı nem ve 15-20°C sıcaklık) hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst taraflarına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.

Buğdayda septorya yaprak lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır.

Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısmına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir.

Aynı şekilde, tarla bulaşık ve başaklanma döneminde yağışlı havalarda devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görüldüğünde başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-14 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Elma karalekesi:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce yapılır.)

2. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Elma küllemesi:

1. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde

2. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70'i döküldüğünde

3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etkisi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Kayısı çiçek monilyası:

1. uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2. uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte yapılır.)

İlaçlama koruyucu olarak dikimle birlikte yapılır.

Narda phytophthora kök ve kökboğazi çürüklüğüne karşı: uygulama hastalığın görüldüğü bahçelerde ilk belirtiler görüldüğünde başlanır, ve hızlı sürgün gelişim dönemlerinde (ilkbahar, yaz, sonbahar) devam edilir.

Yer fıstığında serkospora erken yaprak lekesine karşı: Birinci ilaçlama ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılır. Hasatla son ilaçlama arasındaki süre dikkate alınarak hastalık koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamaya devam edilir.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.

ROYCUR 25 WP

Islanabilir Toz (WP)

GRUP	G1:3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	------	----------------------------

%25 Tebuconazole

Göz ile Teması Halinde; Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontak lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması Halinde; Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSİ

- Balıklara zehirlidir, su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaşmamalıdır.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanılmamalıdır.
- Bitki koruma ürününün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgârlı havada uygulama yapmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden uzakta, kilitli, iyi havalandırılan, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.
- Boş ambalajları başka bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.ve TİC.LTD. ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16 İç kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com

Fatihhan Kürşad TURGUT

Ruhsatlandırma Sorumlusu

**ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
TİCARET SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**

Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No: 16 İç Kapı No: 106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Ziyapaşa V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com



26 Aralık 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ROYCUR 25 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ROYCUR 25 WP**'nin aynı sezonun içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

ROYCUR 25 WP diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYCUR 25 WP

Islanabilir Toz (WP)

GRUP	G1:3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	------	----------------------------

%25 Tebuconazole

Fatihhan Kürşad TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

**ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**
Çiftlik Mah. 61037 Sok. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
E Blok No: 16 Kat: 108 Seyhan/VADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Teli: 0322 502 76 51
Ziyapaşa V.D. 735 071 2000 Info@royalfen.com

26 Aralık 2024
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

