

İMAL TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ :  
ŞARJ NO :  
RUHSAT TARİH VE NO :

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı     | Zararlı Organizma Adı   | Uygulama Dozu  | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|---------------|---|----------------|--|
| BUĞDAY        | Pas Hastalıkları<br>Sarı pas ( <i>Puccinia striiformis</i> )<br>Kahverengi Pas<br>( <i>Puccinia recondita tritici</i> ) | 100 ml/da      | 56 gün                                 |
|               | Kara Pas<br>( <i>Puccinia graminis tritici</i> )  |                |  |
| ŞEKER PANCARI | Yaprak Leke Hastalığı<br>( <i>Cercospora beticola</i> )   | 50 ml/da       | 56 gün                                 |
| ELMA          | Elma karalekesi ( <i>Venturia inaequalis</i> )  | 45 ml/100 L su | 14 gün                                 |

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR  
30 Ocak 2025



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

# ROYGUARD SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

| GRUP | G1:3    | FUNGİSİT (Mantar İlacı) |
|------|---------|-------------------------|
|      | 125 g/l | Flutriafol              |

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.  
**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/10 KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Soluma Sonrası;** Hastayı açık havaya çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurun.

**Cilt Teması Sonrası;** Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

**Göz Teması Sonrası;** Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

**Yutma Sonrası;** Yutulması durumunda ürün etiketi veya bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinçli kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermemeyi ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

NET MİKTARI :  
AZAMI PER.SAT.FİYATI :  
İÇİNDEKİLER:  
1- Flutriafol

Ek-1

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P261: Spreyini solumaktan kaçınınız.

P264: Kullanmadan sonra su ile iyice yıkayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanınız.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanım talimatlarına uyun.

Fatihhan Kürşad TURGUT  
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM (İTHALAT)  
İHRACAT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Çınarı Meş. 81027 Sok. Sımsı Nuri Çomu İş Merk.  
B. Blok No:16 K. Katı No: 106 Seyhan/ADANA  
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 61  
Ziyapasa V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com



#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hastalıklara karşı başarılı bir mücadele yapabilmek ve iyi bir ürün verimi elde edebilmek ilk hastalık enfeksiyonlarının başladığı zaman mücadelenin yapılması ile mümkündür.

#### Buğday- Pas Hastalıkları:

Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir.

#### Şekerpancarı- Yaprak Lekesi Hastalığı:

İlaçlamalara hastalık için uygun hava koşulları olduğunda ve tarlada yapraklar üzerinde ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır. Hastalığın seyrine göre kullanılan ilacın etki süresi hesaplanılarak ilaçlamalara devam edilir.

#### Elmada kara leke hastalığı:

1.Uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerde 3-5 gün önce)  
2.uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde,  
3.uygulama çiçek taç yapraklarının %70-80'i döküldüğünde,  
4. ve diğer uygulamalara ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ve hastalığın seyrine göre devam edilmelidir.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**ROYGUARD 125 SC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup G1:3** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ROYGUARD 125 SC**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup G1:3 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılması önerilmez.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

## ROYGUARD SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

| GRUP | G1:3               | FUNGİSİT<br>(Mantar İlacı) |
|------|--------------------|----------------------------|
|      | 125 g/l Flutriafol |                            |

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLE Ek-1 AR

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kulla
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına l in kaçırınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaç için kullanmayınız, usulüne uygun o imha ediniz.
- Kullanılmayan ilacı ağız sıkıca kapalı, çocukların ulaşamayacağı kilitli yerl gıda maddeleri ve yemlerden uzakta muhafaza ediniz.
- Kullanmadan önce bitki koruma ürününi kendi şişesinde iyice çalkalayınız.

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmad depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir deęişik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini gar eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatb veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu deęildir.

#### RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

**ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT**

**İHRACAT SAĞ VE TİC.LTD.ŞTİ.**  
Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No: kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 [info@royalfen.com](mailto:info@royalfen.com)

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 [info@royalfen.com](mailto:info@royalfen.com)

**Fatihhan Kürşad TURGUT**  
Ruhsatlandırma Sorumlusu

**ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT**  
**İHRACAT SAĞ VE TİC.LTD.ŞTİ.**

Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.  
B.Blok No:16 Kapı No: 106 Seyhan/ADANA  
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51  
Ziyapaşa V.D. 735 07 2000 info@royalfen.com

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

30 Ocak 2025



d 39