

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO : 30.07.2024/13205

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	100 ml/100 l su Nimf-Ergin	21 gün
Bağ*	Unlubiti (<i>Planococcus ficus</i> , <i>Planococcus citri</i>)	100 ml/100 l su Nimf-Ergin	14 gün
Biber (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/100 l su Larva-Pupa	3 gün
Domates (Tarla)	Patates yaprakbiti (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	75 ml/da Nimf-Ergin	3 gün
Domates (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/100 l su Larva-Pupa	3 gün
Elma	Elma yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	50 ml/100 l su Nimf-Ergin	21 gün
Marul	Marul yaprakbiti (<i>Nesonovia ribisnigri</i>)	75 ml/da Nimf-Ergin	7 gün
	Pamuk-Kavun yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)		
	Yeşil Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)		
Pamuk	Pamuk-Kavun yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	100 ml/da Nimf-Ergin	-
Patlıcan (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/100 l su Larva-Pupa	3 gün
Şeftali	Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulecaspis pentagona</i>)	75 ml/100 l su Nimf-Ergin	21 gün
	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	75 ml/100 l su Larva	
Nektarin	Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulecaspis pentagona</i>)	75 ml/100 l su Nimf-Ergin	21 gün
	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	75 ml/100 l su Larva	
Turunçgiller**	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	75 ml/100 l su Nimf-Ergin	14 gün
	Turunçgil kırmızı kabuklubiti (<i>Aonidiella aurantii</i>)	75 ml/100 l su Nimf-Ergin	
	Turunçgil sarı kabuklubiti (<i>Aonidiella citrina</i>)	75 ml/100 l su Nimf-Ergin	
	Turunçgil yeşil yaprakbiti (<i>Aphis citricola</i>)	75 ml/100 l su Nimf-Ergin	
	Turunçgil unlubiti (<i>Planococcus citri</i>)	100 ml/100 l su Nimf-Ergin	

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.

** Turunçgilde faydalılara karşı yan etki denemesi uygun görülmüştür.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.lhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYVENTO

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	23	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	----	--------------------------

100 g/L Spirotetramat

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¾'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası; Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Cilt Teması Sonrası; Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glykol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz Teması Sonrası; Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası; Ağız çalkalayınız. Kusturmayınız. Doktora veya zehir danışma merkezine başvurunuz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

NET MİKTARI :
AZAMI PER.SAT.FİYATI :
İÇİNDEKİLER:
1. Spirotetramat

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H315:** Cilt tahrişine yol açar.
- H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H361fd:** Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
- H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P102:** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P201:** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P202:** Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
- P261:** Spreyini solumaktan kaçının.
- P264:** Kullanmadan sonra su ile iyice yıkayın.
- P273:** Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P391:** Döküntüleri toplayın.
- P405:** Kilit altında saklayın.
- P501:** İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeryüzü ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş ambalajları başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.
- Hazırlanan bitki koruma ürünü hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla karışım hazırlamayınız.

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomuş İş Merk.
E Blok No:16 İç Kapı No :106 Seyhan / Adana
Ticaret Sicil No : 63174 Tel. 0322 502 76 51
E-posta V.D. 735 071 2038 info@royal-fen.com.tr

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Layih Başkanı

FAHRETTİN KUTLU
MÜHÜR

10 Haziran 2024
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLİŞTİR
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYVENTO

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	23	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	-----------------------------

100 g/L Spirotetramat

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çorno İş Merk.
B Blok No:16 İç Kapı No :106 Seyhan / Adana
Ticaret Sicil No : 63174 Tel. 0322 502 76 51
Ziyapaşa V.D. 735 071 2000 info@rcyafe.com.tr

Haydar Aliyev
Firma Təsisçisi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başlandığı, sürgünlerin

%15'ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Bağda Turuncgöl unlubiti'ne karşı; spirotetramat sistemik etkili aktif maddedir, mayıs ayı itibarı ile canlının herhangi bir dönemine rastlanırsa uygulama yapılmalıdır. 1 ay sonra gözlem yapılarak yeni yumurta paketleri ve larva görülürse ve popülasyonda artış gözlenirse ikinci bir uygulama daha yapılır.

Domates (Sera), Biber (Sera) ve Patlıcan (Sera) Tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Domatese (Tarla) Patates yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek, 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitto ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar verilmenden önce faydallıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Marulda da, yeşil şeftali yaprakbiti-marul yaprakbiti-pamuk kovan yaprakbitine karşı; Nisan ayından itibaren yapılan gözlem sonucunda 100-1000 m2 de 10-20 adet bitkide yaprak başına ortalama 20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar verilmeden önce faydaların etkinliği ve hava sıcaklığı göz önünde bulundurulmalıdır.


Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Laire Başkanı

0 Haziran 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMEKTEDİR.

Pamukta yaprakbitine karşı; fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında ilaçlı mücadele önerilir.

Şeftali ve nektarinde Dut kabuklubitine karşı; zararlının gözlenmesi kimyasal mücadeleyi gerektirir. Büyük bahçelerde yüksek yoğunlukların bulunması durumunda kış mücadelesine başvurulabilir. Yaz mücadelesinde uygulama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Şeftali ve nektarinde Şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun $\frac{3}{4}$ 'ü kanatlı forma dönüşüncüye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır.

Turuncgilde yaprakbitlerine karşı: Uygulama Mart ve Nisan aylarında ağır (bir ağaçta ortalama 15'den daha fazla sürgün bulaşık) bulaşmanın görüldüğünde yapılmalıdır. **Turuncgilde kırmızı-sarı kabuklubite karşı;** yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf sayısı A. *citrina*' da 20'den fazla ise veya 100 yaprağa düşen A. *aurantii* miktarı 50'den fazla ise uygulama yapılmalıdır. Uygulama yazın eşeysel ekici tuzaklarda ergin sayısı maksimuma ulaştığında, ilk hareketli nimfler görüldükten yaklaşık 15 gün sonra, yapılmalıdır.

Turuncgil unlubiti'ne karşı bahçedeki meyveler yaklaşık fındık (greyfurtta ceviz büyüklüğünde) iriliğine geldiği zaman ağacın dört ayrı yönünden ve içten her ağaç için 5'er meyve olmak üzere toplam 100 meyve kontrol edilir. Kontrol edilen meyvelerin en az 15 adedi bulaşık ise uygulamaya karar verilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ROYVENTO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ROYVENTO**'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmak isteniyorsa, karışım yapılmadan önce ön karışım testi yapılmalıdır.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.

ROYVENTO

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	23	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	----	-----------------------------

100 g/l Spirotetramat

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.ve TİC.LTD. ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16

İç kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No:16 İç Kapı No :106 Seyhan / Adana
Ticaret Sicil No : 63174 Tel: 0322 502 76 51
Ziyapaşa V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

Haydar Aksoy
Firma Temsilcisi

10 Haziran 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL

