

İMAL TARİHİ :
 SON KULLANMA TARİHİ :
 ŞARJ NO :
 RUHSAT TARİH VE NO :
 KULLANILACAGI BITKİ VE YABANCI OTLAR



Royal-Fen Kimya Tarım İth. Ihr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Ek-2

Bitki Adı	Zararlı Organizma	Uygulama Dozu	Son Başlama ile Haset Arasındaki Süre
Bağ*	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Kanyaşlar 6-10 yapraklı veya 15-30 cm boyda iken	28 gün
	Köpekdili ayırıcı (<i>Cynodon dactylon</i>)	150 ml/da Köpek dişi ayırıcı çiçeklenme öncesi devrede iken	28 gün
Domates	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	75 ml/da Darıcanlar 10-12 cm boyda iken	28 gün
Kanola	İtalyan Çimi (<i>Lolium multiflorum</i>)	100 ml/da İtalyan çimi 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda	28 gün
	Kendi gelen buğday (<i>Triticum spp.</i>)	50ml/da Buğday 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda	28 gün
Mercimek	Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>)	50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi; yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken	56 gün
	Kısırlı yabani yulaf (<i>Avena sterilis=Avena ludoviciana</i>)		
	Kendi gelen buğday (<i>Triticum spp.</i>)		
Patates	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Kanyaşlar 15-20 cm boyda iken	28 gün
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da Darıcanlar 8-10 cm boyda iken	
Pamuk	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Kanyaşlar 15-25 cm boyda iken, bir ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir.	56 gün
Soğan	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da Soğanın 2 yapraklı devresinde	28 gün
	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)		
	Kısırlı yabani yulaf (<i>Avena sterilis=Avena ludoviciana</i>)	50 ml/da Yabani yulafın kardeşlenme döneminde	

ROYTUVA EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	A1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
150 g/l Fluazifop-p-butyl		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayıniz
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanımınız.
- Bitki koruma Ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma Ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayıniz.
- İnsan ve çevre sağlığı Üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN DRÜNLERİN DİŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan Drünün boş ambalajlarının içine X'One kadar temiz su koyarak lıce çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMELERİ:

Deri İle Teması Halinde; Derhal ilaçın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç degen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahrîş devam ederse doktor çağın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce lıce yıkayın.

Göz İle Teması Halinde; Gözleri açık tutarak yavaş ve yumuşak hareketlerle su içinde 15-20 dakika çalkalayın. Varsa kontakt lenslerini çıkarın. Gerekliyorsa derhal tıbbi yardım alın.

Solunması Halinde; Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa sunlu solunum yaptırın. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

Yutulması Halinde; Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTOU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidot yoktur. Semptomatik tedavisi uygulanır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA ve KONTROL GENEL MİDÜRLÜĞÜ

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

KABUL EDİLMİŞTİR

24 Aralık 2024

NET MİKTARI :
 AZAMI PER.SAT.FİYATI :
 İÇİNDEKİLER:
 1. Fluazifop-p-butyl

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLIKE

ZARARLILIK İFADELERİ(H):

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P102: Çocukların erişmeyeceği yerde saklayınız.

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sıvısını/buharını/spreyi solumayın.

P270: Bu ürünleri kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P308 + P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P391: Döküntülerini toplayın.

P501: İçeriği/kabi yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Ariala zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayıniz.
- Balıklar İçin zehirlidir. Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Rüzgare karşı ilaçlama yapmayıniz.
- Tikanmış memeleri ağızınızla üßleyerek açmayıniz. Fırça ile temizleyiniz.
- İlaçlı mahlûk tamamını tarlaya püskürtünüz. Hazırlanmış ilaç aynı gün içinde kullanınız.
- Her ilaçlamadan sonra aletinizi temizlemeden diğer mücadele işlerinde kullanmayıniz.

Fatih Kürşad TURGUT
Ruhname Müdürlüğü

ROYAL FEN KİMYA TARIM İHRACAT İNVESTİSYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İstinye Mah. 6101/5 Sk. Serice Nuri Demir Mah. 12 No: 18 M. Kili No: 106 Seyhan/ADANA

Tel: 0312 502 76 51 Zabıta No: 735 071 2000 info@royalfen.com

Dr. Naser ÇAKIR ARICAN

Daire Başkanı



Şekerpançarı	Kısrı yabani yulaf (<i>Avena sterilis=Avena ludoviciana</i>)	50 ml/da Yabani yulafın kardeşlenme döneminde	56 gün
	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Kanyaş 15-30 cm boyda İken	

*Tüketim amaçlı bağı yapraklı hasadı yapacak bitki alanlarında kullanılınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRAYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı bellirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

ILAÇLAMA MAKINESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayın. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLÜ:

ROYTUVA EC, geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan Gramineae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkıştan sonra (post-em.) kullanılan sistemik etkili, selektif bir bitki koruma ÜrünÜndür.

ROYTUVA EC uygulama ile hasat arası süreye uymak kaydı ile geniş yapraklı kültür bitkilerinin her dönemde kullanılabilir. Uygulama sırasında yabancı otların aktif gelişme içerisinde olmaları daha iyi bir etki alınmasını sağlar. Daha önce kültürel işlemlerle, çok yıllık yabancı otların rizomları parçalanmışsa bu durum mücadeleden daha iyi sonuç alınmasını sağlar.

ROYTUVA EC uygulamadan 3 saat sonra yağan yağmurden etkilenmez.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

ROYTUVA EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A1 olarak sınıflandırılmış bir Herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma Ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ROYTUVA EC' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayıza. Uygulamanın tekrarlanması gereklili durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A1 hariç) bitki koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILİRİLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma Ürünler ile karıştırmadan kullanınız.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYTUVA EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	A1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
	150 g/l Fluazifop-p-butyl	

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl : kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) değişiklik olmaz.

Ek-2 fiziksel, nda bir

FİRMA BEYANI:

Orjinal ambalajlarında satılmak kaydı ile İmalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksikslikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÖRETİM TESİSİ:

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkz ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16 lç kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com

Fatihhan Kürşad TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi
B-Blok No:16 lç kapı No:106 Seyhan/ADANA
Ticaret SK No: 63114 Tel: 0322-502-76-51
Ziyareti V.O: 735 071 3600 info@royalfen.com



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

24 Aralık 2024