

İmal Tarihi :
 Son kullanma tarihi :
 Şarj no :
 Ruhsat Tarihi ve no :
ÜRÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİLER

BİTKİ ADI	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA AMACI ve ZAMANI
Hububat	Buğdayda 125 ml/da	Yatma riskini azaltır. Buğday, bitki boyu:10-20 cm iken, Çavdar, bitki boyu 20-30 cm iken, Yulaf, bitki boyu 30-40 cm iken uygulanır. Yetiştirildiği yere bağlı olarak hububatın farklı tiplerinin tekil çeşitlerinin, uygulamaya tepslisi farklı olabilir.
Pamuk	100-150 da/50-100 lt su	Tohum ekiminden 75-90 gün sonra uygulanır.
Geçitlik	200-800 ml/da	Sürgün başlangıcında uygulanır. Verim artışı sağlar.
Süs Bitkileri	Püskürtme ile uygulamada %0,08 (W/v) ile %0,8'lik (w/v) solüsyonlar uygundur. Sulama ile uygulamada ise yaklaşık %0,4 (w/v) ile %2,5 (w/v) hazırlanan solüsyonlar uygundur.	Bitki boyunun kısa kalmasını ve çiçeklenmeyi sağlar. Bitki kökleri ve yaprakları tarafından alınabildiğinden püskürtme veya sulama ile uygulanabilir.
Bağ*	100-500 ml/da	Sürgün başlangıcında. Verimi artırır.
Elma, Şeftali, Kayısı	250-400 ml / 100 l su	Tomurcuklanmayı ve ağaçları dona karşı direncini artırır.
Domates	100-150 ml/da	Bitkinin gelişimi ve direncini artırır. Tam çiçeklenmeden başlanarak uygulanır. Bitkinin gelişimine ve direncine bağlı olarak 15-20 gün aralıklarla 2-3 uygulama.
Fasulye, Bezelye	200 ml / 100 l su	Çiçeklenme öncesi kullanılır. Olgunlaştırmayı geliştirir.
Patates	250-300 ml / da	Çiçeklenmeden 2-3 hafta önce uygulanır. Sürgünleri geciktirmek, erkenciliği ve verimi artırarak daha düzgün biçimli patates gelişimi için kullanılır.

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

royalfen
 KİMYA TARIM LTD. ŞTİ.

Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYSON 46 SL

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUP	-	Bitki Gelişim Düzenleyici
460 g/L Chlormequat chloride		

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
 - EVDE KULLANMAYINIZ
 - ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA KULLANMAYINIZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMAMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
 - KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJININ DÖRTTEBİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA MAKİNESİNİN DEPOSUNA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Göz: Göz kapaklarını açık tutarak 15 dakika akan suyun altında iyice yıkayın. Göz doktoruna başvurun.

Clit: İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Yutma: Ağzınızı yıkayın ve sonra bol su için. Tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

Solunum: Kişiyi temiz havaya çıkartın. Dinlendirin. Tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜVE TEDAVİSİ: Semptomatik tedavi (dekontaminasyon, hayatli fonksiyonlar), bilinen özel bir antidotu yoktur.

Net miktarı:
 Azami perakende satış fiyatı:
 İÇİNDEKİLER
 Chlormequat chloride
 ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

ÖNLEM İFADELERİ:

P264: Kullanmadan sonra su ile iyice yıkayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P330: Ağzınızı çalkalayın

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.

-Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.

-Boş ilaç ambalajlarını başka amaçlara kullanmayınız ve imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) depolarda ve kendi ambalajında açılmadan saklandığında fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikler en az iki yıl korur.

FİRMA BEYANI

Orjinal ambalajlarında satılmak kaydı ile üreticiler bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üreticiler bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
 GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 KONTROL EDİLMİŞTİR

25 Şubat 2025

Fatihhan Kürşad TURGUT
 Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
 KİMYA TARIM LTD. ŞTİ.
 Çarşıbaşı Sokakı No:105 Şişli/Beşiktaş/İstanbul
 Tel: 0212 302 76 11
 ZARARLILIK İŞARETLERİ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ve karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Chloromequat chloride suda çözündüğünden bitkinin kökleri ve yaprakları tarafından kolayca alınır. Sap cidarını kalınlaştırarak ve sapı kısaltarak hububatta (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.) sap esnekliğini ve direncini artırır. Sonuç olarak uygulandığı hububat bitkisi, bitkinin yatmasına neden olan elverişsiz bütün iklim koşullarına karşı direnç oluşturur. Sap cidarının kalınlaşmasından ötürü EYESPOT hastalığı ile istila riski önemli ölçüde azalır. Yatma riskini azaltmasından dolayı yüksek oranda Azotlu gübreler kullanılabilir. Buda bazı hububat çeşitlerinde hasat veriminin daha iyi olmasına yol açar. Süs bitkilerinde bitki boyunun kısa kalması ve çiçeklenmeyi teşvik etmek amacı ile kullanılır. Sebze, meyve, bağ, pınc ve pamukta verimi önemli ölçüde artırır.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

ROYSON 46 SL'nin diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYSON 46 SL

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUP	-	Bitki Gelişim Düzenleyici
------	---	---------------------------

460 g/L Chloromequat chloride

RUHSAT SAHİBİ FIRMA ve ÜRETİM TESİSİ:
 Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
 Merkez Ofis: Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş
 Merkezi B blok No:16 İç Kapı No:106
 SEYHAN/ADANA/TÜRKİYE
 Tel:0 (322) 50276 51 info@royalfen.com
 Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi
 Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE
 Tel: 0 388 503 0880 info@royalfen.com

Fatihah Kürşad TURGUT
 Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYSON 46 SL KONSANTRE (SL) İZHALAT
 İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
 Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
 Merkezi B blok No:16 İç Kapı No:106 Seyhan/ADANA
 Tel:0 (322) 50276 51
 7.yapıya K.D. 735 071 3300 info@royalfen.com



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
 GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 KONTROL EDİLMİŞTİR

25 Şubat 2025