

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO :



Royal-Fen Kimya Tarım Kth.lhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYHOT EC

EC (Emülsiyeli Olabilen Konsantre)

GRUP	F4	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
		480 g/l Clomazone

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine %'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Deri ile Teması Halinde; Cildi su ve sabun ile iyice yıkayınız. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın ve yeniden kullanmadan önce yıkayınız. Tıbbi yardım alın.

Göz ile Teması Halinde; Hemen bol su ile yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açınız. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın.

Solunması Halinde; Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sabit tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşmesini sağlayın.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İDARE VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

NET MİKTARI :
AZAMI PER.SAT.FİYATI :
İÇİNDEKİLER : Clomazone
ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLÜKE

ZARARLILIK İFADELERİ(H):

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.
P260 Tozunu/dumanını/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.
P264 Elleçlemeden sonra ... ile iyice yıkayın.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
P304+P341 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRAYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamada yelpaze hüzmeli memeler kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Fatihhan Kürşat TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Etiler Mah. 81007 Sok. Dinarlı Çırmı İş Merk.
B Blok No:18 İç Kapı No:1/8 Sayhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Ziyapeşe V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

14 Mayıs 2025

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Çeltik;

Ekim Öncesi Kullanım:

Keskinlikle keseksiz bir tava hazırlanmalıdır. İlaç tavsiye edilen dozda toprak yüzeyinde pülverize edilmeli. İlaçlamada, dekara ortalama 30 litre su kullanılmalı. İlaçlamadan sonra toprak işleme yapılmamalı. İlaçlamadan sonraki ikinci gün su verilmemeli, dördüncü gün tohum atılmalıdır.

Erken Çıkış Sonrası Kullanım:

ROYHOT EC, çeltiğin 1-2 yapraklı olduğu erken çıkış sonrası dönemde suyu boşaltılmış tavalara havadan veya yerden uygulanabilir. İlaçlamadan sonra en geç 2-3 gün içerisinde tavalara su verilmesi tavsiye olunur. Uygulamadan sonra tavaya en geç 3 gün sonra su dolumu yapılır.

ROYHOT EC'nin en etkili şekli rezidüeldir. Toprakta etkili çıkış yapacak olan yabancı otlara karşı etkilidir.

ROYHOT EC çıkış yapan yabancı otlarda beyazlaşma şeklinde kendini gösterir, bu süre 7-21 gün arasında değişmektedir.

Kanola;

Çıkış Öncesi kullanım:

Keseksiz, iyi işlenmiş bir tarla hazırlığından sonra ekim yapılır. Ekimi takiben, maksimum 2 gün sonra çıkış öncesi uygulama yapılır. Uygulamadan sonra toprak işleme yapılmaz. Dekara 20-40 lt su ile uygulama yapılır. Yalpaze hüzmeli meme ile kullanılmalıdır.

Ayçiçeği;

Çıkış Öncesi kullanım:

Keseksiz, iyi işlenmiş bir tarla hazırlığından sonra ekim yapılır. Ekimi takiben, maksimum 2 gün sonra çıkış öncesi uygulama yapılır. Uygulamadan sonra toprak işleme yapılmaz. Dekara 20-40 lt su ile uygulama yapılır. Yalpaze hüzmeli meme ile kullanılmalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

ROYHOT EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F4 olarak sınıflandırılmış bir Herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ROYHOT EC nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F4 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.Ihr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYHOT EC

EC (Emülsiyeye Olabilen Konsantre)

GRUP	F4	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
------	----	-----------------------------

480 g/l Clomazone

Yutulması Halinde; Ağzı su ile iyice çalkalayın. Birkaç bardak su veya süt içirin. Kusma tehlikesi olabileceğinden, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Kusma meydana gelirse, kusmuğun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yerüstü sularına t in kaçınız.
- Rüzgâra karşı ilaçlama yapmayınız.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.IHR.SAN.ve TIC.LTD. ŞTİ

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16 İç

kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol

Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com

Fatih Kurşad TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İLMACAT SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No:16 İç Kapı No: 106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Teli 0322 502 76 51
Ziyapaşa V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

14 Mayıs 2025