

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO : 14.07.2025 / 13665

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Biber (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	80 ml / 100 l su	10 gün
Domates (sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	90 ml / 100 l su Larva,	10 Gün
	Yaprak galerisineği (<i>Liriomyza trifolii</i>)	80 ml / 100 l su	10 Gün
	Domates güvesi (<i>Tuta absoluta</i>)	80 ml / 100 l su	10 Gün
Domates (tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	90 ml da Larva,	10 Gün
	Domates güvesi (<i>Tuta absoluta</i>)	80 ml da Larva,	10 Gün
Hıyar (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	80 ml / 100 l su	10 Gün
Kornişon (sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	80 ml/100 L su (larva)	10 Gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRAYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İlaç normu: Domates güvesi (*Tuta absoluta*) zararlısına karşı tavsiye edilen ilaç normu miktarı dekara ortalama 40 litre olmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.

ROYBEST 63 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	28	6	İnsektisit-Akarisit
45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin			

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE

YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Deri ile Teması Halinde; Elbisenizi çıkarınız, derinizi sabunlu su ile iyice yıkayınız.

Göz ile Teması Halinde; göz kapaklarını açarak, gözünü akan suyla 10-15 dakika süreyle yıkayınız.

Solunması Halinde; Zehirlenmeden şüpheleniliyorsa derhal işi bırakın ve temiz havaya çıkarın. Doktora ilaç ambalaj ve etiketi ile hastayı götürün.

Yutulması Halinde; Bol su ile aktif tıbbi kömür verilir. Baygın hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyiniz, kusturmayınız. Hastayı ilaç ambalajı ile derhal doktora götürünüz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHRİ MERKEZİ (UZEM) TEL:114



NET MİKTARI :
AZAMI PER.SAT.FİYATI :
İÇİNDEKİLER : Chlorantraniliprole, Abamectin
ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ(H):

- ✓ H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- ✓ H332 Solunması halinde zararlıdır.
- ✓ H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- ✓ H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
- ✓ H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- ✓ EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.
- ✓ ÖNLEM İFADELERİ (P):
- ✓ P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- ✓ P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
- ✓ P264 Elleçlemeden sonra ... ile iyice yıkayın.
- ✓ P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- ✓ P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- ✓ P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- ✓ P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- ✓ P391 Döküntüleri toplayın.
- ✓ P501 İçeriği/ kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- ✓ Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- ✓ Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Rüzgâra karşı ilaçlama yapmayınız.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.

ratnam KURŞAD TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

**ROYAL FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**

Çınar Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No: 16 İç Kapı No: 708 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Ziyapaşa V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ROYBEST 63 SC hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

Biber (sera) pamuk yaprakkurdu:

Serada köşegenler yönünde yürüyerek 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Sürvey, serada 10-12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Eşiğin üzerinde bir zararlı popülasyonu görülmesi halinde ilaçlamalar yinelenmelidir. İlaçlama, larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından ilaçlama zamanına özen gösterilmelidir.

Sezon içerisinde 1'den fazla uygulama önerilmez.**Domates Yeşilkurt (tarla-sera):**

Tarla veya seranın büyüklüğüne göre 100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkinin 5'nin bulaşık olması halinde derhal mücadeleye geçilir. İlaçlamadan 10 gün sonra bitkiler kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa ilaçlama tekrarlanır.

Domates Domates güvesi (tarla-sera):

Ergin çıkışını saptamak için üretim sezonu başlangıcından itibaren tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeyssel çekici tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada 1 kontrol edilir. Tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3'ü yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. Uygulamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilerek, gerekli ise ilaçlamaya karar verilir.

Domates- yaprak galerisineği (sera):

Bir dekarlık alanda en az 30 bitkinin alt, orta ve üst yaprakları toplanarak sayım yapılır. Yaprak başına ortalama 10 larva tespit edilirse ilaçlamaya karar verilir.

Bu ilaçla bir sezonda 1'den fazla uygulama önerilmez.**Hıyar-Kornişon- pamuk yaprak kurdu (sera):**

100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlama yapılır. 10-12 gün aralıklarla yapılan kontrollerde eşiğin üzerinde bir popülasyon görülmesi durumunda ilaçlama tekrarlanır. Uygulama larvalar dağılmadan önce yapıldığında sonuç daha iyi olacağı için ilaçlama zamanına özen gösterilmelidir.

KISITLAMA VE UYARILAR:

ROYBEST 63 SC, etki şekli itibari ile anthracitic diamide sınıfından bir kimyasal olan Chlontraniliprole içermektedir. Yüksek derecede duyarlılık azalışı veya dayanıklılık potansiyeli olan zararlı türlerinin bu ilaç grubuna duyarlılığını sürdürebilmek için: Bu ilacı, bir uygulama programı içerisinde kullanınız ve aynı etki mekanizmasına sahip ilaçlar ile ardışık olarak kullanmaktan kaçınınız.

- ❖ Anthracitic diamide kimyasal grubu insektisitleri takiben, farklı etki mekanizmasına sahip diğer bitki koruma ürünlerini dönüşümlü olarak kullanınız.
- ❖ Bir üretim sezonu içerisinde bu grup bitki koruma ürünlerini, toplam uygulamaların %50'sinden fazla uygulamamaya özen gösteriniz.
- ❖ Ziraî mücadele programlarına IPM tekniklerinin dahil edilmesini sağlayınız.
- ❖ Sezon içerisinde biyolojik etkinlikte olası azalmaları izleyiniz.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

ROYBEST 63 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 28 ve 6 olarak sınıflandırılmış bir Herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ROYBEST 63 SC** nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 28 ve 6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.lhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYBEST 63 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	28	6	Insektisit-Akarisit
			45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16 İç Kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com

Ratihhan Kürşad TUĞUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

**ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**

Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No: 16 İç Kapı No: 106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 83174 Tels: 0322 502 76 51
Ziyapaşa V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com



14 Temmuz 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR