

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO : 06.08.2025 / 13718

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Biber (sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 ml / 100 l su	3 gün
Çilek	Çilek küllemesi (<i>Sphaerotheca macularis</i> f.sp. <i>fragariae</i>) Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/da	3 Gün
Domates (sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 ml / 100 l su	3 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	60 ml/100 L su	14 Gün
Hıyar (sera)	Sebzelerde beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Kornişon (sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Marul (tarla)	Sebzelerde beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	100 ml/da	3 gün
Patlıcan (sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Soğan-Sarımsak	Soğan pası (<i>Puccinia porri</i>)	100 ml/da	7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaç normu: Çilek Kurşuni küf (*Botrytis cinerea*) zararlısına karşı tavsiye edilen ilaç normu miktarı dekara ortalama 30-100 litre olmalıdır.

06 Ağustos 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.lhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYCUB SC

SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre)

GRUP	D1:9	C2:7	Fungisit (Mantar İlacı)
------	------	------	-------------------------

375 g/l Pyrimethanil +125 g/l Fluopyram

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¾'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Deri ile Teması Halinde; Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır. Tahriş söz konusu ya da semptomlar devam ederse doktora ya da UZEM'e başvurunuz.

Göz ile Teması Halinde; Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Eğer göz tahriş olmuşsa veya gözde kırmızılık devam ediyorsa, doktora ya da UZEM'e başvurunuz.

Soluması Halinde; Temiz havaya çıkartınız. Soluk alıp vermede zorlanma varsa derhal doktora veya UZEM'e başvurunuz.

Yutulması Halinde; Ağzı bol su ile çalkalayınız bir hekime danışmadan kusturmayınız. Derhal doktora veya UZEM'e başvurunuz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHRİ MENKEZİ (UZEM) TEL:114



NET MİKTARI :
AZAMI PER.SAT.FİYATI :
İÇİNDEKİLER : Pyrimethanil, Fluopyram
ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ(H):

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Rüzgâra karşı ilaçlama yapmayınız.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Fatih Kırşad TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Çınar Mah. 6327 Sk. Sunay Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No:16 İç Kapı No:106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Yüreğir V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ROYCUB SC hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

Çilek kurşunu küf

- 1.ilaçlama:** İlk çiçeklerin %10'u açtığı dönemde,
- 2.ilaçlama:** Çiçeklerin %50'sinin açtığı dönemde,
- 3.ilaçlama:** İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde,
- 4.ve diğer ilaçlamalar:** Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi ve son ilaçlama ile her bir hasat arasında geçmesi gereken süre dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar devam edilir.

Çilek çilek küllemesi,

Birinci uygulama ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılır. İkinci uygulama kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkana kadar uygulamalara devam edilir. Aynı sezon içerisinde maksimum 3 uygulama tavsiye edilir.

Domates (sera), Biber (sera), Patlıcan (sera) kurşunu küf

Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalara 10 gün arayla hastalığın seyrine göre devam edilir. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Aynı sezon içerisinde maksimum 2 uygulama önerilir.

Elma elma karalekesi

Birinci uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) yapılır. İkinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu devresinde (çiçekler kısa sapları ile ayrı ayrı görüldüğünde) yapılır. Üçüncü uygulama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce yapılır. Dördüncü ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılır.

Hıyar (sera), Kornişon (sera), ve Marul (tarla) beyaz çürüklük:

Kimyasal mücadele toprak ilaçlaması veya yeşil aksam ilaçlaması halinde yapılabilir.

Toprak ilaçlaması: İlaçların etiketlerinde belirtildiği şekilde ekim veya dikimden önce uygulanır.

Yeşil aksam ilaçlaması: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.

Hıyar ve kornişon ürünlerinde bir (maksimum iki) uygulama yapılması önerilir.

Soğan-sarımsak soğan pası

Uygulama yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. Yapraklarda pas püstülleri görülür görülmez uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etki süresi dikkate alınarak 10 gün arayla uygulamaya devam edilmelidir. Aynı sezon içerisinde maksimum 2 uygulama önerilir.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

ROYCUB SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup **D1:9** ve **C2:7** olarak sınıflandırılmış bir Fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ROYCUB SC** nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup **D1:9** ve **C2:7** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYCUB SC

SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre)

GRUP	D1:9	C2:7	Fungisit (Mantar İlacı)
------	------	------	-------------------------

375 g/l Pyrimethanil +125 g/l Fluopyram

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.ve TİC.LTD. ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16 İç Kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com



Erdoğan KURŞAD TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

**ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHHACAT SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.**
Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No:16 İç Kapı No: 106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Yüreğir V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

06. Ağustos 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.