

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	Zararlı Organizma Adı	Uygulama dozu ve dönemi
Mısır	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	30 ml/da Mısırdaki çıkış sonrası (2-3 yaprak), yabancı otlarda çıkış sonrası (post-emergence)
	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	35 ml/da Mısırdaki çıkış sonrası (2-3 yaprak), yabancı otlarda çıkış sonrası (post-emergence)
	İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	30 ml/da Mısır ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre- emergence)
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	35 ml/da Mısır ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre- emergence)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

royalfen
KİMYA TARIM LTD. ŞTİ.
Roya-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYPLAN

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	F2	27	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
225 g/l Isoxaflutole + 90 g/l Thiencazone-methyl + 150 g/l Cyprosulfamide (safener)			

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKLİDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine X'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülür.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarınız ve sakın bir şekilde yatırmayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Cilt Teması Sonrası: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz Teması Sonrası: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınız.

Yutma Sonrası: Ağız çalkalayınız. Kıpırdatmayınız. Kusturmayınız. Tıbbi bakım alınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: İlk tedavi: belirtilere göre. Karaciğer fonksiyonlarını dikkatle izleyin. Mide yıkanması normal olarak gerekli değildir. Eğer büyük miktarlarda (ağız dolusundan fazla) yutulmuşsa, aktif karbon ve sodyum sülfat verilmelidir. Özel bir antidot bilinmiyor.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI:

İÇİNDEKİLER

1. Isoxaflutole
 2. Thiencazone-methyl
 3. Cyprosulfamide (safener)
- ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
- H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P308+P313: Maruz kalınma veya etkilene halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
- P405: Kilit altında saklayın.
- P391: Döküntüleri toplayın.
- P501: İçerdiği/kabı yereel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.
- EUH208: 1,2-Benzisothiazolin-3-one içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
- KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**
- Kalan ilaç mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz.
- Balıklara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir, sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- İlaçlama esnasında ilacın bittiği/sonundaki ürünlere sürüklenmemesine dikkat ediniz.
- İlaçlı yerde hayvan otlatmayınız, ot almayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.

Fatihhan Kürşad TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT LİMİTED ŞTİ.

Çarşı Mah. 2022/2. Kat Kat: 106 Seyhan/ADANA
B. Blok Kat: 16 Kat: 106 Seyhan/ADANA
Tic Sicil No: 283174 Tel: 0322 502 76 51
Ziyapazarı V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

20 Kasım 2024

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ROYPLAN mısır bitkisinin ekiminden çıkış sonrası (2-3 yaprak) dönemine kadar uygulanabilen toprak herbisididir. Mısırın 3 yapraklı döneminden sonra kullanılmamalıdır. **ROYPLAN** etkili maddelerinden Isoxaflutole hem yaprak hem de kökler tarafından, daha çok kökler vasıtasıyla alınır ve yabancı ot bünyesinde hem floem hem de ksilemden taşınarak sistemik etki gösterir. Damlama sulama yapılan alanlarda sulama sisteminin iyi olmadığı durumlarda ilacın etkinliğinde düzensizliklere neden olabilir. Yeterli yağışın olmadığı ve kuraklık problemi yaşanan alanlarda ilacın uygulama sonrasında ilk 7-10 gün içerisinde gerekli toprak neminin sağlanması için yağmurlama sulama yapılması tavsiye edilmektedir.

MÜNAVEBE VE TEKRAR EKİM:

ROYPLAN uygulanmış alanlarda normal mısır hasadından hemen sonra pulluk ile derin toprak işlemesi (30-35 cm) yapılmak suretiyle; 6 ay sonra marul (fide), soğan, buğday ekim/dikimi yapılabilir. Diğer ürünler için lütfen firmamıza danışınız.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

ROYPLAN isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F2:27 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, **ROYPLAN** yerine takip eden sezonda farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2:27 hariçi) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

ROYPLAN, başka ilaçlarla karışım halinde kullanılmaz. **ROYPLAN**, başka ilaçlarla karışım halinde kullanılmaz. **ROYPLAN**, başka ilaçlarla karışım halinde kullanılmaz.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.

ROYPLAN

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	F2	27	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	----	----	--------------------------------

225 g/l Isoxaflutole + 90 g/l Thiencazabazone-methyl + 150 g/l
Cyprosulfamide (safener)

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depo süresi ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörüsü (to) dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16 İç Kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol

Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com

Fatihhan Kürşad TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.

Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No:16 İç Kapı No: 106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Ziyapaşa V.D. 735 071 2090 info@royalfen.com

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

20 Kasım 2024