

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİHİ VE NO :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
	Kırmızı köklu tilikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken Uzun süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>) Bozot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Demir dikenli (<i>Tribulus terrestris</i>)	Çiğış sonrası 1. uygulama 200 ml/da Şekerpancari tam kottiledon aşamasında, yabancılardan 2-4 yapraklı dönemimde. 2. uygulama 200 ml/da ilk ilaçlamadan 7-10 gün sonra 3. uygulama ikinci uygulamadan 7-10 gün sonra	90 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır duruma kadar karışım depoya ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın iletildiği belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır. İlaç normu: Şekerpancari Sirkem (Chenopodium album) zararlına karşı önerilen ilaç normu dekaraya ortalama su miktarı 20-40 lt olmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çaiştirarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

royalfen
KİMYA TARIM LTD. ŞTİ.

Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYFATO SC

GRUP	Cl,5	K3,15	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
	350 g/l Metamitron + 150 g/l Ethofumesate		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİNİ DIŞINDA KULLANILMASI KİSİNLİKLE

YASAKTIR

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJININ İÇİNE % 'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ. ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülür.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Deri ile Teması Halinde; Kirilenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Kirilenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Göz ile Teması Halinde; Hemen tıbbi yardım alın. Hemen bol su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın.

Soluması Halinde; Kazazedeyi kirilenme kaynağından uzaklaştırın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çektiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunum gerçekleşebilmesini sağlayın.

NET MİKTARI :
AZAMI PER.SAT.FİYATI :
İÇİNDEKİLER :
Benzisothiazolin-3-one
Metamitron, Ethofumesate, 1,2

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ(H):

- H302: Yutulması halinde zararlıdır.
- H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- H336: Rahavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- H400: Sucul ortamda çok toksiktir
- H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- ÖNLEM İFADELERİ (P):
- P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P264: Elleçlemeden sonra sabun ile iyice yıkayın.
- P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
- P271: Sadece dışarda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- P273: Çevreye verilmemesinden kaçın.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P310: Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P330: Ağzınızı çalkalayın.
- P391: Döküntüleri toplayın.
- P405: Kilit altında saklayın.
- P501: İçeriği/kabı çevre yönetmeliğine uygun bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anıları zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Rüzgâra karşı ilaçlama yapmayınız.
- İlaçlı mahallün tamamını tarlaya püskürtünüz. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.

Merzuka KÜÇÜKŞAHİN
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Cınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nun Çomu İş Mark.
B Blok No:16 İç Kapı No: 196 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 76 51
Y/teğir V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ROYFATO SC hakkında bir şikâyetiniz olması halinde il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

ROYFATO SC bölünmüş doz (split) uygulaması ile ardışık olarak 7-10 gün ara ile 3 uygulama şeklinde kullanılır. 1. uygulamadan sonra ot çıkışı olmasa dahi 2. ve 3. Uygulamalara devam edilmelidir.

Normal şartlar altında tüm şekerpancarı çeşitleri ROYFATO SC'ye çok iyi tolerans (uyum) gösterir. Pancar stres altında iken bitki koruma ürünlerine karşı çok hassastır. Sürekli yağın yağmurlardan sonra büyüme geriliği, ani sıcaklık değişimleri, daha önce kullanılan BKÜ, yüksek ışık, uygulama sırasındaki ortam sıcaklığı, kuvvetli rüzgar, devamlı düşük ısılar, böcek ya da mantar zararı gibi diğer faktörler şekerpancارını strese sokabilir ve kotiledonlar zarar görebilir, yeterince büyüme gerçekleşmez. Bu durumlarda herbisit kullanımı, durumu daha da kötüleştirir için stres altındaki şekerpancارına herbisit kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

EKİM-DİKİM MÜNAVEBESİ:

Hasattan sonra tüm bitkiler yetiştirilebilir. Uygun olmayan çevre koşullarında özellikle küçük buğday olmak üzere sonrasında ekilen bitkilere zarar verebilir. Şayet son uygulama ile bir sonraki ekilecek-dikilecek bitki arasında ortalamamın altında yağış gerçekleşmişse buğday ekiminden önce derin toprak işleme yapılması önerilir. Sonrasında patates ve mısır ekilecekse derin toprak işleme önerilir. Tarlayı erken bozma durumunda 15-20 cm derinlikte bir toprak işleme yaptıktan sonra şeker ve hayvan pancarı ile mısır ve patates ekilebilir.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

ROYFATO SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1,5 ve K3,15 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ROYFATO SC nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1,5 ve K3,15 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San. Ve Tic. Ltd.Şti.

ROYFATO SC

Süspansiyon Konsantré (SC)

GRUP	C1,5	K3,15	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
			350 g/l Metamitron + 150 g/l Ethofumesate

Yutulması Halinde: Tıbbi yardım alın. Ağzıyla iyice çalkalayın. Herhangi bir prötez mevcut ise çıkarın. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Kusma meydana gelirse, kusmuşün akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağzdan bir şey vermeyin. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda yan tarafına yatırın ve solunum gerçekleşmesini sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysisinin sıkı bölümlerini gevşetin...

ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre doktor değerlendirilmesiyle tedavi uygulanır.

ULJSAZ ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değışiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilağlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilağlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.ve TIC.LTD.ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16 İç Kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com

Mertzuka KÜÇÜKŞAHİN
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT MEN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Mark.
B Blok No:16 İç Kapı No. 106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Yüreğir V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com