

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	100 g /100 l su	14 gün
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	185 g / 100 l su	14 gün
	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)		
Kayısı	Yaprak delen (çil) (<i>Wilsonomyces carpophylus</i> = <i>Stigmia carpophila</i>)	200 g /100 l su	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışimli su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaç normu: Domates Mildiyö (*Phytophthora infestans*) zararlısına karşı tavsiye edilen ilaç normu miktarı dekara ortalama 30-60 litre olmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

29 Haziran 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



royalfen
KİMYA TARIM LTD. ŞTİ.
Royal-Fen Kimya Tarım İth.lhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ATİBA WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUP	M4	Fungisit (Mantar İlacı)
%80 CAPTAN		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buharını ve zerrecelerini teneffüs etmeyiniz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

• **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluması Halinde; Hastayı temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, acil durum merkezini veya ambulansı aradıktan sonra suni solunum yapın. Suni solunum ağızdan ağıza yapılacaksa, uygulayıcı cep maskesi kullanılmalıdır. Ulusal Zehir Danışma Merkezine ya da Doktora danışın.

Deri ile Teması Halinde; Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

Göz ile Teması Halinde; Derhal gözleri, göz kapaklarını altını bol su ile 15 dk boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Tahriş oluşursa tıbbi yardım alın.

Yutulması Halinde; Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı doktor söylemedikçe kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

NET MİKTARI :
AZAMI PER.SAT.FİYATI :

İÇİNDEKİLER:
1. Captan

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.
- H330:** Soluması halinde toksiktir.
- H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.
- H351:** Kansere yol açma şüphesi var.
- H361f:** Üremeye zarar verme şüphesi var.
- H372:** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
- H314:** Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

- P273** Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P391** Döküntüleri toplayın.
- P501** İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklar için zehirlidir, yer altı ve yerüstü sulara bulaştırmayınız.
- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden uzakta, kilitli, iyi havalandan, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.
- Boş ambalajları başka bir gaye için kullanmayınız.

Merzuka KÜÇÜKŞAHİN
Ruhsatlandırma Sorumlusu
ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Çınarlı Mah. 61327 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No:16 İç Kapı No: 106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Yüreğir V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

ATİBA WG hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

Elma karalekesi:

1. **uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),
2. **uygulama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde),
3. **uygulama:** Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. **ve diğer uygulamalar:** Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, 10 gün ara ile yapılmalıdır.

Domates mildiyözü: Mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelik gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilmelidir.

Yaprak delen (çil)(Kayısı):

1. **uygulama:** Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra,
2. **uygulama:** İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.
3. **uygulama:** Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ATİBA WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup **M4** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ATİBA WG**'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup **M4** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ATİBA WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUP	M4	Fungusit (Mantar ilacı)
------	----	-------------------------

%80 CAPTAN

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİM TESİSİ

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16

İç kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com

Merzuko KÜÇÜKŞAHİN
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No:16 İç Kapı No: 106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Yüreğir V.D. 735 671 2000 info@royalfen.com



29 Haziran 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.