

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO :

KULLANILACĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
ARMUT	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	40 g / 100 L su nimf, ergin	7 gün
	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)		
ELMA	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	40 g / 100 L su larva	7 Gün
BAĞ	Bağ tripsleri (<i>Rubiothrips vitis</i> , <i>Mycterothrips albidicornis</i> , <i>Mycterothrips tschirkunae</i> , <i>Thrips tabaci</i>)	30 g / 100 L su larva, ergin*	7 Gün
	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	20 g / 100 L su yumurta, larva**	
ŞEFTALİ /NEKTARİN	Çiçek tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	30 g / 100 L su larva, ergin	7 Gün
PAMUK	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 g/da larva	21 gün
	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)		
ANTEPFISTIĞI	Antepfistığı psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	30 g/100 L su nimf, ergin	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaç normu: Elma içkurdu (*Cydia pomonella*) zararlısına karşı tavsiye edilen ilaç 8 Eylül 2026
miktari dekara ortalama 25-50 litre olmalıdır.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.lhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYFERO 25 WG

WG (Suda Dağılılabilen Granül)

GRUP	5	İnsektisit (Böcek İlacı)
%25 Spinetoram		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Deri ile Teması Halinde; Hemen cildinizi 15 – 20 dakika süreyle bol su ve sabun kullanarak yıkayınız. Bulaşan giysilerinizi çıkartınız ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yıkayınız. Temizlenemeyecek durumda olan ayakkabılar ve diğer eşyaları uygun biçimde imha ediniz.
Göz ile Teması Halinde; Gözü açık tutarak yavaş ve yumuşak hareketlerle su ile 15 – 20 dakika süreyle iyice durulayınız. Kontak lensler mevcutsa 5 dakika sonra çıkarınız ve bir süre daha gözleri yıkamaya devam ediniz. Bir göz doktoruna danışınız.

Solunması Halinde; Kişiyi ilacli yerden uzaklaştırın, temiz havaya çıkarın. Eğer nefes almıyorsa acil durum merkezini arayın veya ambulans çağırdıktan sonra suni solunum yapın. Suni solunum ağızdan ağıza yapılacaksa uygulayıcı koruma maskesi kullanın. Bir doktora yada UZEM'e danışın.

Yutulması Halinde; Mağduru zorla kusturmayın. Derhal bir doktora veya UZEM'e danışın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



NET MİKTARI :
AZAMI PER.SAT.FİYATI :
İÇİNDEKİLER : Spinetoram
ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ(H):

H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H332: Ciltle teması halinde zararlıdır.
H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir
H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
H361F: Üremeye zarar verme şüphesi var.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P203: Kullanımdan önce tüm güvenlik önlemlerini okuyun ve anlayın.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P318: Tüm güvenlik önlemleri okunmadan elleçlemeyin.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
P391: Döküntüleri toplayın.
P405: Kilit altında saklayın.
P501: İçeriği/kabı yönetmeliğe uygun bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Rüzgâra karşı ilaçlama yapmayınız.
- İlacli mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.

Merzuka KÜÇÜKŞAHİN
Ruhsatlandırma Sorumlusu
ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Çınarlı Mah. 81027 Sk. Sınar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No:16 İç Kapı No: 106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 03174 Tel: 0322 502 76 51
Yüreğir V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ROYFERO 25 WG hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

Armut psillidine karşı

Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı, sürgünlerin %15'ten fazlasında bulaşma görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Armut, Elma – Elma içkurduna karşı

“Zehirli Yem Kısmi Dal” yöntemi kullanılır. Bunun için hazırlanan cezbedici+insektisit karışımı ruhsatlı dozunda ağaçların güneydoğu yönündeki bir dalında 1m2 'lik alan ıslanacak şekilde (100-150 ml ilaçlı su olacak şekilde) uygulanır. İlaçlamada bir sıra ilaçlanır, bir sıra atlanır. İkinci aşamada ise, ilaçlanmayan sıralar ilaçlanarak daha önce ilaçlanan sıralar boş geçer. Ağaçlar içten dışa doğru kuru yer kalmayacak şekilde ilaçlanır. Elma içkurduna mücadelesinde, eşeysel çekici tuzaklarla zararlıların ergin uçuşu takip edilir. Kışlayan dölde iki hafta üst üste toplam 6 kelebek, yaz döllerinde ise haftada 3 kelebek yakalandığında ve ilk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlama yapılır.

Şeftali, Nektarinde – Çiçek tripsine karşı

Çiçeklenme başlangıcından itibaren bahçe düzenli olarak gözlemlenmeli, zararlı ve yararlı organizmaların popülasyon yoğunlukları takip edilmelidir. Çiçek thripsinin varlığı ve yoğunluğu gözle inceleme yöntemiyle belirlenmelidir. 100 sürgünün en az %10'u zararlı ile bulaşırsa çiçeklerin %5'i açıldığında uygulama yapılır.

Pamukta yeşilkurt'a karşı

Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğu tespit edilirse uygulamaya karar verilir.

Pamukta pamuk yaprak kurduna karşı

10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Antepfıstığı psillidine karşı

Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20 – 30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı

İlaçlama zamanının belirlenmesinde eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı, fenolojik gelişme ve yumurta açılımı takip edilmelidir. İlk keleklerin yakalanmasından sonra tuzak kontrolleri düzenli olarak yapılmalı, yumurta kontrolleri ile ilk larva çıkışı belirlenmelidir. İlaçlama, ilk larva çıkışından hemen önce veya ilk larva çıkışı görüldüğünde yapılmalıdır. Mücadele, zararlının ekonomik zarar oluşturabilecek yoğunluğuna ve döl gelişimine göre tekrarlanmalıdır.

Bağ tripslerine karşı

İlaçlama zamanının belirlenmesinde, asmanın fenolojik gelişme dönemi ve trips yoğunluğu dikkate alınır. Çiçeklenme döneminden itibaren salkımlar ve genç sürgünler düzenli olarak kontrol edilir. Tripslerin özellikle çiçek ve salkımlarda yoğun olarak görülmesi ve zarar oluşturma riskinin bulunması durumunda ilaçlama yapılır.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.lhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYFERO 25 WG

WG (Suda Dağılılabilen Granül)

GRUP	5	Insektisit (Böcek İlacı)
------	---	--------------------------

%25 Spinetoram


DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Merzuka KÜÇÜKŞAHİN
Ruhsatlandırma Sorumlusu
ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Çınarlı Mah. 1027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No:46 İç Kapı No: 106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Yüreğir V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com



03 Eylül 2026
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

ROYFERO 25 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 5 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ROYFERO 25 WG** nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 5 harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYFERO 25 WG

WG (Suda Dağılılabilen Granül)

GRUP	5	Insektisit (Böcek Ilacı)
------	---	--------------------------

%25 Spinetoram

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.ve TİC.LTD. ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16
İç kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol
Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com

Merzuka KÜÇÜKŞAHİN

Ruhsatlandırma Sorumlusu

**ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No:16 İç Kapı No: 106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Yüreğir V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

03 Eylül 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EKİ

Soğuk

